

**FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ****Transfuzní oddělení**Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň - Bory
alej Svobody 80, 304 60 Plzeň - Lochotín
IČO 00669806 tel.: 377 401 111, 377 103 111**ŽÁDANKA O AUTOLOGNÍ ODBĚR PRO AUTOTRANSFUZI**

Odběrové středisko Transfuzního oddělení Bory, sídlo: 17. listopadu 12, PLZEŇ, telefon: 377 402 818

Odběry se provádí bez objednání: po - pá 6:30 – 12:00 hod (pro potřeby HOO do 14:00 hod)

U výkonů plánovaných na pondělí - odběr krve nejpozději v pátek do 10:00 hod. Pokud lze, je šetrnější mezi odběrem a plánovaným výkonem mít pauzu cca 7 dnů.

VYPLNÍ ORDINUJÍCÍ LÉKAŘ – Nalepte, prosím, štítek s identifikací pacienta na originál i kopii žádanky

**Tento formulář je pouze informační.
Proto jej NETISKNĚTE a tiskopis si objednávejte
v sekretariátu TO – tel. 377 402 813.
Originální tiskopis je propisovací !!!**

Z odebrané plné krve (PK) standardně připravíme autologní erythrocyty (EBR nebo ERD) a autologní plazmu (P).
V případě jiného požadavku vyznačte žádaný typ transfuzního přípravku: TADR PA (aferetická plazma, 650 ml celkem = 3 TU) jiné, jaké:

Datum: Razítko a podpis ordinujícího lékaře:

VÝSLEDKY VYŠETŘENÍ PŘED ODBĚREM

Datum	Hb	Leuko	Trombo	HTK	Krev. skup.	Krevní tlak	Puls	Teplota	Váha

VYPLNÍ TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ – Propuštění dárce k odběru

Poř. č.	Datum	Závěr	Podpis lékaře	Důvod vyřazení odběru, poznámka
1		<input type="checkbox"/> VYHOVUJE <input type="checkbox"/> NEVYHOVUJE		
2		<input type="checkbox"/> VYHOVUJE <input type="checkbox"/> NEVYHOVUJE		
3		<input type="checkbox"/> VYHOVUJE <input type="checkbox"/> NEVYHOVUJE		

Výsledky vyšetření autologních odběrů:

Datum	Číslo odběru	Poř. č.	Množství	Přípravky	Odebral (podpis)	Imunohematol. vyšetření	Podpis	Infekční markery podpis
	C 2008	1.		EBR ERD P TADR PA				Při 1. vyšetření
	C 2008	2.		EBR ERD P TADR PA				
	C 2008	3.		EBR ERD P TADR PA				

Propuštěno dne: 1. 2. 3.

Podpis lékaře: 1. 2. 3.

Další rezervované přípravky:

Číslo přípravku: Krevní skupina: Druh přípravku:

Číslo přípravku: Krevní skupina: Druh přípravku:



Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti s plánovaným operačním zákrokem je předpokládána potřeba transfuze (převodu krve). Jednou z možností je podání vlastní krve na základě Vašeho dobrovolného rozhodnutí. **Autologní odběr** je odběr vlastní krve pacienta. **Autotransfuze** je transfuze pacientovy vlastní krve či jejích částí. Každá léčebná metoda má své výhody, je však nutno počítat i s určitým rizikem či komplikacemi. U autotransfuzí výhody převažují.

Postup přípravy autologních přípravků

S odběry krve začneme zhruba 2 – 3 týdny před plánovaným operačním výkonem. Vlastní odběr a počet odběrů je omezen hodnotami Vašeho krevního obrazu. Optimální interval mezi jednotlivými odběry je 7 dní, poslední odběr provádíme nejpozději 3 dny před plánovaným datem operace. Při jednom odběru je odebráno 450 ml plné krve. Dle hodnot krevního obrazu Vám bude doporučeno užití přípravku železa.

Před odběrem krve Vám bude změřen krevní tlak a tělesná teplota a bude vyšetřen krevní obraz. Lékař transfuzního oddělení posoudí Váš zdravotní stav v den odběru. Z odebrané krve provedeme dále vyšetření krevní skupiny a vyšetření na přítomnost známek infekce HBV (žloutenka B), HCV (žloutenka C), HIV (původce AIDS) a syfilis (lues, přijíce).

Před odběrem je nutné alespoň dva dny předem zvýšit pitný režim více než jste zvyklý/á. K odběru krve byste neměl/a přicházet nalačno, vhodná je netučná snídaně. Pokud jste zvyklý/á pít kávu, dejte si ji, pouze doplňte dostatkem tekutin.

Výhody výkonu

Mezi výhody zejména patří zamezení přenosu infekčních nemocí a tvorby protilátek proti cizím látkám (antigenům). Zároveň není negativně ovlivňován Váš imunitní (obraný) systém. Je podstatně sníženo nebezpečí vzniku potransfuzních reakcí.

Nevýhody výkonu

Odběry vlastní (autologní) krve jsou vhodné jen pro některé druhy operací a jen za určitých zdravotních podmínek pacienta. Tato rizika zhodnotí ošetřující lékař, který zná podrobně Váš zdravotní stav a který provedení autotransfuze doporučuje.

Rizika odběru

Jako nežádoucí reakce na odběr se může objevit krevní výron v místě vpichu – nebezpečí vzniku této komplikace snížíme řádným stlačením místa vpichu po odběru. Dalším rizikem je celková reakce organismu (mdloby), které předcházíme dostatečným příjmem tekutin a několikaminutovým setrváním v odběrovém křesle po skončení odběru.

V případě, že nebude možno odběr provést nebo budete v souvislosti s plánovanou operací potřebovat podání většího množství krve, než kolik činí zásoby Vaší autologní krve, bude pro Vás zajištěna krev od cizích dárců krve, tzn. krev alogenní.

Vám odebraná krev pro autologní transfuzi nemůže být podána jinému příjemci, a pokud nebude Vámi spotřebovaná, bude zlikvidovaná.